



Názov úradu OBEC KUZNICE	
Dátum: 27. 05. 2021	
Podacie číslo: 1499/2021	Číslo spisu: OCW-78/2021
Prílohy/listy:	Vybavuje:

Pod# a rozde#ovníka

Váš list #islo/zo d#a

Naše #islo

Vybavuje/linka

Trebišov

OU-TV-OSZP-2021/005563-005

JUDr. Jana Zbojovská/
0961715764

26. 05. 2021

Vec

Žiados# o zabezpe#enie prevencie proti komárom
- stanovisko z h#adiska ochrany prírody a krajiny

D#a 12.05.2021 bola na Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny doru#ená žiados# obcí Zemplínske Jastrabie, Ve#ké Trakany a Sirmík o zaujatie stanoviska k zabezpe#eniu prevencie proti komárom.

Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán pod#a § 5 zákona NR SR #. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 64 ods. 1. písm. d) a § 68 zákona NR SR #. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (#alej len „zákon o OPaK“), vydáva k predmetnej žiadosti pod#a § 9 ods. 2 zákona o OPaK nasledovné

s t a n o v i s k o .

Predmetom žiadosti je zabezpe#enie prevencie proti komárom.

Odborné stanovisko k predmetnej veci zaslala Štátna ochrana prírody SR, Správa Chránenej krajinskej oblasti Latorica (#alej len ŠOP SR, CHKO Latorica) listom #. CHKOLA/143-001/2021 zo d#a 20.05.2021. Komáre patria do radu dvojkrídlovce (Diptera) a #e#ade komárovité (Culicidae). Komáre patria medzi hmyz s úplnou premenou a majú štyri vývinové štádiá: vají#ko, larva, kukla, imágo (dospelý jedinec). Vají#ko, larva a kukla potrebujú na svoj vývin vodné prostredie, imága sú naopak suchozemské. Sami#ky vä#šiny druhov komárov cicajú krv, pretože bielkoviny z krvi hostite#a potrebujú na stavbu a vývin svojich vají#ok. Samce krv necicajú. Ako zdroj energie slúži obom pohlaviam nektár z rastlín (BECKER a kol. 2010). Samice kladú 50-500 vají#ok 2-4 dni po nácicaní krvi (v chladnejších oblastiach neskôr). Niektoré druhy, napríklad druhy rodov Anopheles, Culex, Culiseta, Coquillettidia a Uranotaenia, kladú vají#ka do vody, kde sa po krátkej dobe liahnu larvy. Druhá skupina druhov kladie vají#ka na vlhkú zem do rôznych pôdnych depresí, kde neskôr dôjde k zaplaveniu vají#ok vodou (Aedes a Ocherotatus). Tieto vají#ka #asto #akajú na vhodné podmienky (záplava, privalové dažde) aj nieko#ko rokov. Ke# je vají#ko zaplavené vodou, dochádza v #om k vývinu embrya. Rýchlos# tohto vývinu závisí od teploty vody, pri#om pri vysokej teplote vody sa liahne vají#ko už za pár hodín. Nikdy sa však neliahnu všetky naraz, ale pri každom zaplavení vodou sa vyliahne len #as# z nakladených vají#ok na rovnakom mieste. Táto adaptácia zabra#uje tomu, aby zahynula celá populácia, ak by nastali nevhodné podmienky na dokon#enie vývinu (rýchly ustup vody po záplave, sucho a pod.). Prvé larválne štádium sa nazýva prvý instar. Táto larva má vyvinutý tzv. vaje#ný zub, pomocou ktorého sa dostala z vají#ka. Larva potom prechádza ešte druhým, tretím a štvrtým instarom. Larvy sa živia vä#šinou drobnými mikroorganizmami alebo #iasto#kami rozloženej organickej hmoty. #ím je voda teplejšia, tým je larválny vývin rýchlejší. Larva prijíma kyslík zo vzduchu nad vodnou hladinou, pri#om s vodnou hladinou je spojená rúrkou na

konci tela (sifó), cez ktorú dýcha. Larvy rodu Anopheles nemajú takúto rúrku ale iba otvory, cez ktoré dýchajú. Štvrtý instar larvy sa nakoniec zakuklí. Kukla dýcha atmosférický vzduch cez lievikovité útvary na hlave a neprijíma potravu. Toto štádium trvá zvyčajne 2 dni. Jeho dĺžka však opäť závisí od teploty. Keď nastane správny čas, kukla praskne v chrbtovej časti a vylezie z nej dospelý jedinec. Ten musí počkať, kým vyschne a stuhne jeho vonkajšia vrstva tela – kutikula. Neskôr komáre vyhadávajú úkryty v hustých porastoch, kde sú počas dňa chránené pred priamym slnkom, nakoľko ich telo je náchylné na vysušenie. Väčšina našich druhov sa pári za letu, a teda vo voľnom priestore. Samce sa roja pred západom slnka a samičky lákajú zvukom svojich krídel. Kopulácia trvá iba niekoľko sekúnd. Samičí ejakulát obsahuje látku, ktorá spôsobí, že samička je už neprístupná páreniu po zvyšok života. Samice však majú uložený dostatok spermií na viacero znášok bez potreby ďalšej kopulácie. Samce sa môžu páriť opakovane. Po kopulácii potrebujú samice krv hostiteľa, aby mohli naklásť vajčka. Existuje niekoľko druhov, ktorých samičky dokážu naklásť prvú znášku vajčok aj bez potreby krvi. Samice majú ústne ústroje prispôbené na prebodnutie pokožky a cicanie krvi. Je dôležité, aby sa krv nezrážala, preto samica vypúšťa do rany sliny s látkami proti jej zrážaniu, ktoré sú podobné ako u pijavíc. Látky obsiahnuté v slinách môžu u hostiteľa vyvolať však alergickú reakciu. Bielkoviny z krvi hostiteľa použijú po nacicaní na stavbu vajčok. Na vyhadávanie hostiteľa majú samice receptory na tykadlách. Láka ich vydychovaný oxid uhlíkatý, kyselina mliečna, pot a rôzne látky vylučované telom. Môžu rozlišovať aj kontrastné objekty voľného pozadia. Krv však neslúži ako primárny zdroj energie (BECKER a kol., 2010). Na lietanie má vplyv teplota, vlhkosť, množstvo svetla, rýchlosť vetra a fyziologický vek komárov. Dospelé jedince dokážu prekonať rýchlosť vetra do 1 m.s⁻¹. Vzdialenosti, ktoré prekonávajú, závisia od druhu, v akom štádiu prekonávajú nepriaznivé podmienky, a sú v rozsahu od niekoľko stoviek metrov (Culex) po desiatky kilometrov (Aedes). V našom podnebnom pásme prezimovávajú niektoré druhy v štádiu vajčeka, iné ako larvy alebo imága (BECKER a kol., 2010).

Komáre sa vyskytujú vo všetkých typoch stojatých vôd (vrátane záhradných jazierok a rôznych nádob, v ktorých sa drží voda minimálne týždeň), poprípade vo veľmi pomaly tečúcich tokoch. Keďže dýchajú atmosférický kyslík, v rýchle tečúcej vode by larvám a kuklám zaplavovalo dýchacie otvory a nemohli by dýchať. Podobne je to aj na veľkých vodných plochách, kde dochádza k vlnám na hladine vplyvom vetra.

Úlohou kontroly, regulácie alebo znižovania počtu komáríh populácií, je minimalizovať ich výskyt v akomkoľvek vývinovom štádiu. Môžeme ju rozdeľovať podľa metód a spôsobu, akým k redukcii komárov dochádza. Nasledujúce delenie je zoradené od preventívnych metód, ktoré môžu realizovať občania, až po chemické metódy, ktoré vo väčšom rozsahu môže realizovať len odborne spôsobilá osoba.

Metódy kontroly komáríh populácií:

- preventívne metódy
- biologické metódy
- biologicko-chemické metódy
- chemické metódy
- ďalšie metódy

Preventívne metódy

Prevenčia, alebo spôsob predchádzania niečomu nežiaducemu, je základnou metódou pri eliminácii komáríh populácií, resp. následkov premnožených stavov. K preventívnym metódam zaraďujeme manažment územia (environmentálny manažment), ktorého cieľom je úprava vegetácie, v ktorej sa komáre zdržiavajú alebo sprístupnenie potenciálnych liahnisk komárov pre následnú biologicko-chemickú metódu kontroly. Manažment územia redukuje úkryt pre dospelé jedince a liahniská. Patrí sem napríklad kosenie, vysušenie mlák a potenciálnych liahnisk, sprietočovanie ramien a pod. Kosenie všetkých porastov však nemusí významne znížiť výskyt komárov v danej oblasti (DE SZALAY a kol., 1996). Dospelé komáre preferujú tie, kde je vyššia vlhkosť. Dlhší pobyt na priamom slnku ich vysušuje a prehrieva (STRELKOVÁ, 2018).

Informovanie verejnosti o nevyhnutných opatreniach, ktoré minimalizujú výskyt komárov na ich pozemkoch môže viesť k úspešnej redukcii komáríh populácií. Obyvatelia môžu zneškodovať liahniská, ktoré nevedomky vytvorili (tzv. antropotelmy), medzi ktoré patria otvorené nádoby na polievanie, staré kvetináče, jazierka bez rýb (ryby slúžia ako prirodzené predátory lariev komárov) a pod. (STRELKOVÁ, 2018). Súčasťou preventívnych opatrení môže byť používanie sieťok proti hmyzu na nádobách na dažďovú vodu určených k polievaniu záhrad alebo zakúpenie nádob, ktoré nemajú otvor prístupný pre komáre. Ďalším typom preventívnych metód kontroly komárov je mechanická ochrana obydľí pomocou sieťok proti hmyzu, zároveň je možné ošetrenie rámov a sietí prípravkami určenými k odpudzovaniu hmyzu (odporúčať sa aplikovať prírodné oleje s insekticídnyimi vlastnosťami). Sieťky proti hmyzu

poskytujú efektívnu ochranu aj hospodárskych zvierat. Na trhu existujú posuvné, rolovacie alebo skladacie sieťky proti hmyzu, určené na strešné okná, zimné záhrady, dvere alebo atypické otvory.

Ďalším príkladom preventívneho odpudzovania hmyzu je umiestnenie pelargónie (*Pelargonium*), ľudovo nazývanej aj muškáty, pod okná z vonkajšej strany. Tieto rastliny odpudzujú hmyz a fungujú ako prírodný repelent.

K odpudzovaniu neprijemného hmyzu môže slúžiť aj aromalampa, do ktorej umiestnime rastlinné oleje, ktoré vykazujú repelentné účinky. Ďalšia metóda nakladania s éterickými olejmi zahŕňa ošetrovanie povrchov verandy alebo altánu.

V neposlednom rade patria do skupiny preventívnych metód pasce proti komárom. Do tejto skupiny radíme ultrazvukové odpudzovače, CO₂ pasce, plynové lapače, elektrické pasce alebo domáce pasce. (<https://www.stream.cz/adost/10017627-odpuzovace-hmyzu-co-se-z-nich-dopravdy-vylucuje-do-vzduchu>).

Keďže základom každej metódy, ktorej úlohou je znížiť výskyt komárích populácií, je presná identifikácia problémových oblastí, nevyhnutnou súčasťou boja proti komárom je monitoring ich výskytu a monitoring výskytu ich liahnisk.

Dôležité je uvedomiť si, že sa jedná o potenciálne liahniská kalamitných (syn. záplavových) druhov komárov závislých na záplavách, a nie domových druhov, ktoré sa liahnú na rôznych miestach v blízkosti ľudských obydlí. Monitoring liahnisk prebieha v niekoľkých krokoch:

1. Hľadanie technického riešenia mapovania. Napríklad použitie počítačovej techniky, tabletu alebo smart telefónu s príjmom GPS signálu. Na vyznačovanie polygónov (mnohouholníkov) potenciálnych liahnisk môže byť použitý program Locus GIS.

2. Dohľadanie potenciálnych liahnisk. K tomuto účelu môže slúžiť program Google Earth a ortofotomapy, na ktorých je možné vidieť podmáčané úasti v sledovanom území. Vhodné je aj využitie výškových máp (3D modelu reliéfu), kde sú znázornené terénne depresie, ktoré sa pri vyliati vody z koryta rieky môžu stať liahniskom. Následne zakreslenie týchto území ako liahniská, napríklad do programu Locus GIS.

3. V treťom kroku je potrebné uskutočniť samotné mapovanie. Terénne mapovanie spočíva v pešom prechádzaní územia. Pri náleze potenciálneho liahniska sa jeho polygón zakreslí napríklad do programu Locus GIS (STRELKOVÁ, 2018).

Zmapované liahniská je možné rozdeliť do nasledovných skupín: trvalé vodné plochy, ramená riek, mokrade, antropogénne prvky (kanále, jamy, smetiská) (STRELKOVÁ, 2018). Bližšie informácie o monitoringu liahnisk sú rozpracované v práci „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v Bratislavskom samosprávnom kraji“, ktorá je voľne dostupná na:

(https://www.researchgate.net/publication/332222291_Monitoring_potencialnych_liahnisk_k_omarov_v_Bratislavskom_samospravnom_kraji)

Zásady ochrany pred komármi a preventívne opatrenia na zamedzenie premnoženia komárov

A.) OBČAN

B.) OBEC alebo MESTO (územná samospráva)

A.) Opatrenia realizované občanmi:

Trvalá starostlivosť o čistotu obytného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní: pravidelného kosenia dvorov, záhrad a bezprostredného okolia domu; pravidelného vyprázdňovania nádob na polievanie záhrad (ak nie je možné vyprázdniť obsah nádoby aspoň v 7-dňových intervaloch, je potrebné nádobu prekryť, na hladinu vody umiestniť plávajúce fólie, najlepšie polystyrénové dosky, alebo naliať na hladinu malé množstvo jedlého oleja, čím sa naruší povrchové napätie vody a zabráni sa larvám a kuklám komárov nadýchnuť vzduchu); likvidácia komunálneho odpadu z okolia ľudských obydlí (najmä plechovky, plastové fľaše, pneumatiky a podobné nádoby, v ktorých sa môžu v zachytenej dažďovej vode liahnúť komáre).

Mechanická ochrana obydlí, umiestňovaním ochranných sietí na okná a dvere. Ich ochrannú funkciu zvyšuje chemické ošetrovanie rámov a sietí reziduálnymi insekticídmi, určenými na tento účel. Rovnako je dôležité chrániť aj uzatvorené priestory na chov hospodárskych zvierat.

Individuálna ochrana osôb spočíva v správnom a primeranom oblečení sa, v používaní ochranných repelentov dostupných v obchodnej sieti a v lekárnach. Vhodné je tiež používať odpudzovače a lapače komárov.

B.) Opatrenia realizované obcami:

Trvalá starostlivosť o čistotu intravilánu obcí a ich blízkeho prírodného prostredia, ktorá spočíva v zabezpečovaní: pravidelného kosenia verejných priestranstiev (priekopy, cintoríny, parky a pod.) a údržbe krovinatých porastov;

brehy rybníkov je potrebné upraviť tak – po súhlase orgánu ochrany prírody!, aby sa ryba mohla dostať až na kraj rybníka; v zarybnenej vode sa komáre neliahnu, pretože larvy a kukly komárov sú veľmi vyhadávanou potravou pre ryby.

Biologická kontrola

Pod biologickou kontrolou komáríh populácií rozumieme využívanie prirodzených predátorov, parazitov alebo patogénov komárov, vďaka ktorým môžeme redukovať výskyt komáríh populácií ich umelým dosadením do ekosystému alebo podporením ekologických nárokov daného druhu.

Prirodzeným predátorom komárov sú najmä ryby, obojživelníky alebo vtáky. Podľa FERRARI, MESSIER & CHIVERS (2008), predpokladom prežitia koristi sú behaviorálne reakcie na predátorov. Zatiaľ čo rozpoznávanie dravcov môže byť vrodené, v mnohých situáciách je to otázka učenia sa. Tím autorov preukázal, že larvy komárov majú schopnosť naučiť sa rozoznávať mloky ako hrozbu prostredníctvom ich zápachu. Autori konštatujú, že pre udržanie znesiteľnej populácie komárov je dôležitá rôznorodosť predátorov v prostredí. Podľa STRELKOVEJ (2018), sú preimaginálne štádiá komárov jednoduchšou korisťou ako dospelé jedince. Chov rýb v jazierkach môže zredukovať výskyt komárov. Podľa RAGHAVENDRA, SHARMA & DASH (2008), takmer všetky druhy dospelých žiab sú mäsožravce a konzumujú bezstavovce, ako sú ulitníky alebo vláknonožce, vrátane komárov. Predátori hmyzu, ako napríklad larvy vážok, sa tiež môžu živiť larvami komárov, ale nie sú príliš účinné pri ich kontrole. Odhaduje sa, že približne 50 žiab môže udržať ryžové pole bez škodlivého hmyzu. To naznačuje, že žaby by mohli kontrolovať populáciu hmyzu vrátane komárov vo všetkých vývojových štádiách. Žaby môžu byť využívané ako predátori komárov, ale zároveň ich nemožno považovať za jediný spôsob ich kontroly. Aj napriek tomu, že aktivita komárov a aktivita vtákov nie je totožná, mnohé druhy vtákov, ktoré sa vyskytujú v blízkosti ľudských obydlií, sa komármi živia. Premnožené stavy komárov, ktoré sú napríklad výsledkom povodní, môžu zapríčiniť zmenu zloženia potravy vtákov a netopierov, pričom sa u nich zvýši podiel komárov v zložení potravy. Napríklad jeden pár dávkovníka prinesie v období kŕmenia mláďatám až 20 tisíc komárov denne. Hmyzožravé druhy vtákov skonzumujú denne približne toľko gramov potravy, ako sami vážia. Ako príklad uvádzame lastovičku (18 g) a belorítku (14 g) atď. V čase hniezdenia môže byť hmotnosť uloveného hmyzu vyššia. Ochrana vtákov a zabezpečenie vhodných podmienok pre ich život v intraviláne miest môže mať význam pri regulácii komáríh populácií. Mnohí ľudia si na obydliá vešajú igelitové vrecká, aby zabránili lastovičkám alebo belorítkam zahniezdiť. Zabrániť znečisteniu okien z hniezd sa dá napríklad osadením drevenej podložky pod hniezdo. Existuje aj možnosť inštalácie umelých hniezd pre vtáky a netopiere na fasády, stopy alebo stromy. Pri sledovaní množstva komárov vo výkaloch netopierov sa zistilo, že čím menší netopier, tým väčšia preferencia komárov v strave. Menšie netopiere môžu byť efektívnejšie pri ich biologickej kontrole. (<https://myliptov.sme.sk/c/4943739/jeden-netopier-zozerie-za-noc-az-tritisc-komarov.html>) Aplikácia pesticídov je jedna z hlavných príčin úbytku netopierov. Aplikovaním pesticídov proti komárom negatívne ovplyvujeme aj ich prirodzených predátorov. Medzi ďalšie dôvody poklesu populácie netopierov patrí znečistenie životného prostredia, riek, nedostatok potravy a úbytok úkrytov a miest na hniezdenie. Medzi skupiny bezstavovcov, ktoré sa živia komármi patria hlavne: Coelenterata, Turbellaria, Arachnidae, Crustacea, Odonata, Heteroptera, Coleoptera, Trichoptera a Diptera. Predátormi dospelých jedincov (imág) sú najmä pavúky a vážky. Medzi parazity komárov patria hlístovce (Nematoda), ktoré kvôli nárokným ekologickým nárokom a chovu znevýhodňujú ich využitie pri kontrole komáríh populácií. Medzi patogény skúmané vo vzťahu k poklesu komárov patria vírusy, huby alebo prvoky. Zatiaľ tieto patogény nepredstavujú významný spôsob redukcie komárov, napríklad kvôli príliš komplexným vývinovým cyklom alebo ťažkosťami s masovou produkciou (STRELKOVÁ, 2018).

Biologicko-chemická kontrola

Biologicko-chemická kontrola komáríh populácií predstavuje prechod medzi biologickou kontrolou a chemickou kontrolou. Medzi biologicko-chemické metódy boja proti komárom patrí napríklad využívanie hormónov alebo proteínov. S-metoprén (IGR – Insect Growth Regulator) je synteticky vyrábaný juvenilný (zvliekací) hormón, ktorý sa aplikuje do vody a zabraňuje komárom dospieť. Nepôsobí na štádium kukly a imág. Používa sa v USA, Kanade a Austrálii. Bolo zistené, že daná látka nepôsobí na väčšinu testovaných necieľových vodných bezstavovcov (STRELKOVÁ, 2018). Medzi ďalšie biologicko-chemické metódy patrí používanie baktérií *Bacillus thuringiensis israelensis* (Bti) a *Bacillus sphaericus* (Bs). Bs je toxický pre druhy rodu *Culex*, z necieľových organizmov môže pôsobiť nepriaznivo na niektoré Psychodidae. Jeho výhodou je, že za určitých podmienok dokáže pretrvávať a rozmnožovať sa v prírode. Bti produkuje proteíny, ktoré sú vysoko toxické pre larvy komárov a niektorých muškovitých (Simuliidae). Zástupcovia niektorých muškovitých žijú v teplejšej vode, kde sa Bti neaplikuje. U necieľových organizmov (komárov) Bti narušá osmoregulačné mechanizmy bunkových membrán v rebe. Necieľové skupiny neaktivujú

tieto prototoxíny kvôli kyslému prostrediu v žalúdku alebo nemajú špecifické receptory v revných bunkách. Tieto prostriedky neobsahujú živé organizmy, preto používanie týchto látok nezara#ujeme medzi biologické metódy regulácie komáríh populácií. Bti sa aplikuje vo forme granúl, prášku, tabliet, #adových guli#iek, roztoku a pod. Medzi výhody patrí #ahká produkcia, stabilita, efektívnos#, ekonomická nenáro#nos#, odbúrate#nos# (do 24 hod.), bezpe#nos# pre #loveka a životné prostredie, žiadna rezistencia komárov a rýchly nástup ú#inku (1-2 dni) (STRELKOVÁ, 2018) Za nevýhodu tejto metódy môžeme považova# pravidelný monitoring liahnisk komárov a kontrolu ú#inku. Na druhej strane každá metóda redukcie komáríh populácií si vyžaduje monitoring a kontrolu ú#inku, v opa#nom prípade nie je možné ur#i# efektívnos# prevedenej metódy. Rozdiel v aplikácii prípravku s ú#innou látkou Bti môže meni# jeho vplyv na životné prostredie a zdravie #udí. Napríklad pri aplikácii tuhých granúl do liahnisk komárov nedochádza k riziku vdýchnutia prípravku #lovekom, ako napríklad pri roztoku. Používanie biologicko-chemických metód k redukcii komáríh populácií vyžaduje dôkladný monitoring, zvázenie rizík pre životné prostredie a zdravie #udí, výber vhodného skupenstva prípravku a spôsobu aplikácie. Pri dodržaní správnych aplika#ných postupov môže Bti predstavova# vhodnú a environmentálne šetrnú cestu redukcie komáríh populácií.

Chemická kontrola

Pod chemickou kontrolou komárov môžeme rozumie# používanie biocídnych výrobkov ur#ených na ni#enie, odpudzovanie a zneškod#ovanie komárov a lietajúceho hmyzu. K jedným z naj#astejšie používaných ú#inných látok biocídnych prípravkov proti komárom patrí cypermetrín. Cypermetrín je ú#inná látka v nesystémových, širokospektrálnych pyretroidných insekticídach, ktoré sa používajú ako pri hubení hmyzu v po#nohospodárstve, tak v lesníctve alebo domácnostiach. Je používaný napríklad na ni#enie hmyzu na bavlna a hlávkovom šaláte, taktiež sa používa na ni#enie švábov, b#ch, termitov a komárov. Táto ú#inná látka v insekticídach pôsobí toxicky na nervový systém #loveka. Medzi symptómy po vystavení jeho ú#inkom patria závrat, nevo#nos#, bolesti hlavy a záchvaty. Látka navyše potlá#a imunitný systém #loveka, inhibuje tvorbu protilátok proti patogénom. Po vystavení ú#inkom cypermetrínu v #ase gravidity boli u mlá#at potkanov pozorované vývojové malformácie. U samcov potkana sa po vystavení látke zvýšil podiel abnormálnych spermii. Látka tiež spôsobuje genetické poškodenia u myší. Ke#že látka zvyšuje výskyt rakoviny p#úc u myší, je klasifikovaná ako potencionálny #udský karcinogén. Zárove# sa považuje za endokrinný disruptor (látky, ktoré narušujú hormonálnu sústavu #loveka) (COX, 1996). Cypermetrín je toxický pre dáž#ovky, ryby, kôrovce, v#ely a iný užito#ný hmyz.

V karte bezpe#nostných údajov prípravku, ktorý sa v SR používa pri chemickej kontrole komáríh populácií v intraviláne miest a obcí je uvedené, že ú#inná látka cypermetrín je nebezpe#ná pre životné prostredie, nemôžeme dopusti# jej uvo#nenie do vôd, môže spôsobi# dlhodobé škodlivé ú#inky vo vodnej zložke životného prostredia, je ve#mi toxická pre vodné organizmy a je #ažko biologicky rozložite#ná.

Prípravky s ú#innou látkou cypermetrínu sú efektívne len pri priamom kontakte s telom dospelého komára. Jeho najvä#šia výhoda je, že pôsobí okamžite na dospelé jedince komárov. Na druhej strane, zabije všetok hmyz, s ktorým sa dostane do priameho kontaktu, a pôsobí vysoko toxicky pre vodné organizmy, #o znemož#uje jeho použitie v blízkosti vodných plôch. Jeho použitie nie je dostato#ne efektívne, ke#že pôsobí len na dospelé štádium komárov, pri#om tieto sa už spravidla stihli spári# a naklás# vají#ka, z ktorých sa vyliahne #alšia generácia komárov. Takýmto spôsobom dochádza pri vhodných podmienkach k opakovanému výskytu premnožení, napriek chemickým zásahom na ich elimináciu.

#alšia #asto používaná ú#inná látka v biocídnych výrobkoch, ktoré sa používajú proti komárom, patrí deltametrín, ktorá rovnako ako cypermetrín patrí do skupiny pesticídov pyretroidov. Tieto látky pôsobia neurotoxicky pre komáre (SINHA a kol., 2004).

Americká agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA- United States Environmental Protection Agency) klasifikovala niektoré pyretroidy ako pravdepodobné karcinogény. Používajú sa pri aplikácii na oble#enie, obuv alebo ako spreje do ovzdušia. EPA #alej neodporú#a aplikáciu týchto látok priamo na kožu (PECHOVÁ, 2012).

Pod#a informácií z karty bezpe#nostných údajov, prípravok s ú#innou látkou deltametrín, ktorý sa používa v intraviláne miest a obcí, môže by# smrte#ný po požití a vniknutí do dýchacích ciest, #alej je charakterizovaný ako jedovatý, škodlivý, môže spôsobi# poškodenie p#úc a pod. Prípravok je ve#mi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými ú#inkami, pri#om výrobca odporú#a zabráni# uvo#neniu do životného prostredia. #alej výrobca informuje, že kontaminovaný odev je potrebné da# okamžite dole a po kontakte s pokožkou sa okamžite umy# ve#kým množstvom vody. Pri práci s prípravkom je potrebné nosi# vhodný ochranný odev, rukavice a ochranné zariadenie o#í alebo tváre. Rukavice sú potrebné odolné proti chemickým látkam pod#a normy EN 374 alebo jej ekvivalentu. Špeciálnu individuálnu ochranu dýchacích ciest je potrebné zabezpe#i# dýchacím prístrojom s filtrom P2 pre škodlivé #astice.

Orgán verejného zdravotníctva (RÚVZ SR) je oprávnený naria#ova# opatrenia podľa § 12 ods. 2, písm. e) zákona #. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov len za účelom predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení. Ke#že riziko prenosných ochorení prenášanými komármi u nás nebolo potvrdené, je výlu#ne v kompetencii samospráv prijat# vhodné a ú#inné opatrenia, a to v súlade s §4 ods. 3 písm. h.) zákona #. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Podľa §4 ods. 3 písm. h.) obec utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvate#ov obcí, chráni životné prostredie. Uskuto#nenie chemickej kontroly komárov, ktoré predstavujú riziko pre zdravie #udí môže byť v rozpore s §4 ods. 3 písm. h.) zákona #. 369/1990.

V prípade, ak samospráva rozhodne o zabezpe#ení postrekov proti komárom na svojom území, môže takúto #innos# zabezpe#i# výhradne prostredníctvom osoby, ktorá je držite#om osved#enia o odbornej spôsobilosti na prácu s prípravkami na reguláciu živo#išných škodcov na profesionálne použitie. Predpokladom pre získanie osved#enia o odbornej spôsobilosti na túto #innos# v zmysle platnej legislatívy okrem iného je aj znalos# schválených dezinfek#ných prípravkov, spôsobov ich aplikácie a mechanizmu ú#inku, ako aj pracovných a technologických postupov pri aplikácii prípravkov, vrátane hlavných zásad ochrany zdravia a bezpe#nosti práce pri vykonávaní dezinfekcie. Odborne spôsobilé osoby môžu túto #innos# vykona# prostredníctvom prípravkov, ktoré sú na daný ú#el registrované a uvedené na trh. Prevencia a riešenie tohto problému je v kompetencii Vyšších územných celkov, resp. obcí, avšak opatrenia (#i už chemickej alebo biologickej povahy) proti komárom nie je možné považova# za záchranné práce v zmysle zákona NR SR #. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvate#stva. Ohrozenie verejného zdravia II. stup#a, ktoré je v spomenutom zákone uvedené, ako jeden z typov mimoriadnej udalosti, nie je kalamitný výskyt komárov. Ohrozenie verejného zdravia II. stup#a nastáva v zmysle §48 ods. 2 zákona #. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, napríklad pri výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úrove#.

Nadmerný výskyt komárov nespadá pod definíciu mimoriadnej udalosti v zmysle vyššie uvedeného, pri#om vyhlásenie mimoriadnej situácie a odvolávanie sa na príslušnú legislatívu je zavádzajúce až klamlivé.

Aplikáciu biocídov v SR pre profesionálne použitie, do ktorého patria aj dezinfek#né služby, môže vykonáva# len odborne spôsobilá osoba. Podľa §6 ods. 3 písm. h) a ods. 6 zákona #. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vedie Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach register odborne spôsobilých osôb. Podľa §16 ods. 30 zákona #. 355/2007 Z. z. odborne spôsobilá osoba sa zapisuje do registra odborne spôsobilých osôb. Register odborne spôsobilých osôb je verejne prístupný na webovom sídle príslušného orgánu verejného zdravotníctva a obsahuje meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu odborne spôsobilej osoby a druh #innosti, na ktorú sa osved#enie vydáva (<https://www.ruvzke.sk/sk/node/18/podatelna>). Vykonávate# postreku musí regionálnemu úradu písomne oznámi# miesto, #as a prípravok, ktorým chce na desinfekciu alebo reguláciu živo#išných škodcov použiť#, najneskôr 48 hodín pred za#iatkom postreku.

Informovanos# ob#anov o postrekoch proti komárom

Podľa ÚVZ SR orgány samosprávy (mestá a obce) by s oh#adom na svoje kompetencie uvedené v ustanovení zákona #. 369/1990 Z. z. mali obyvate#ov o #ase výkonu dezinfek#ných zásahov v#as informova#, aby sa v lokalite, v ktorej zásah prebieha nepohybovali #udia (ÚVZ SR).

Ohlasovacia povinnos# môže prebehnú# prostredníctvom SMS systému, rozhlasu, informa#nej tabule, informácií na internete a pod. Ob#ania #astokrát o postrekoch vôbec nevedia. Takáto forma podania informácie ob#anom je pri tak vážnej situácii, ako aplikácia biocídov v obývaných oblastiach, nedostato#ná, a to práve z dôvodu možnej neprítomnosti obyvate#stva v #ase vyhlásenia oznamu, zaneprázdnenosti obyvate#stva vedúcej k ignorovaniu oznamu, #alej môže ís# o deti, turistov, ktorí danému oznamu nerozumeli, nezachytili ho alebo to môžu byť #udia so zdravotným postihnutím, ktorí informáciu v rozhlase nepo#uli.

Výsledkom nesprávne podanej informácie zo strany obce alebo mesta ob#anom môže vies# k vo#nému pohybu obyvate#stva v oblastiach postreku, bez príslušného osobného ochranného vybavenia. Doba a kvalita ohlasovania postrekov, prípadná kontrola akceptácie informácie ob#anmi, je aktuálne v SR na nízkej alebo takmer žiadnej úrovni a vo výlu#nej kompetencii samospráv. V prípade, že ob#ania sú informovaní o postrekoch, je taktiež dôležité pozrie# sa na kvalitu a rozsah daných informácií. Mnohokrát sú informácie podané po#ah#ujúco, zavádzajúco alebo dezinforma#ne. Kvalita a rozsah informácií sú rozdielne, pri#om obce a mestá neinformujú jednotne o aplikácii biocídov v obývaných oblastiach.

Ohlasovacia povinnos# o plánovaných postrekoch zo strany samospráv by mala zah#aa# presné informácie o tom, #o majú ob#ania robi# v prípade, že potrebujú opusti# obydliá v #ase postreku (z dôvodu napr. požiar, lúpež, zdravotné problémy a pod.), akými osobnými ochrannými pomôckami sa majú v danom prípade chráni#, #o robi# v prípade zasiahnutia postrekom, ako chráni# svoj majetok a zvieratá, #o robi# so zasiahnutými predmetmi (prádlo na balkóne,

terase, domáce zvieratá, hračky a iné predmety na záhrade a pod.). Obyvatelia majú ma# informácie o tom, ako dlho po postreku majú osta# vo svojich domácnostiach, #o robi# s domácimi a hospodárskymi zvieratami, zasiahnutými predmetmi mimo obytných priestorov (na záhrade, terase a pod.) alebo ovocím a zeleninou v záhrade. Mestá a obce informujú ob#anov hlavne o tom, aby zabezpe#ili ochranu v#iel, ke#že sa aplikujú neselektívne insekticídy. Na druhej strane tieto prípravky majú negatívny dopad na všetky živo#išne druhy vrátane #loveka, a teda sa týkajú nielen v#iel, ale aj psov, ma#iek, hospodárskych zvierat a pod. Národné toxikologické informa#né centrum poskytuje telefonickú službu a poradenstvo v prípade expozície pesticídmi a v prípade prejavu ved#ajších ú#inkov vie pomôc# aj záchranná služba, ktorá urýchlene poskytne potrebnú pomoc, avšak, aby tieto inštitúcie mohli urýchlene kona#, je potrebné vedie# k expozícii akej látky došlo, #o môže komplikova# nezverejnenie názvu aplikovaného prípravku zo strany obce alebo mesta a zárove# nedostato#ný spôsob informovania ob#anov o prebiehajúcich postrekoch. Jedným z pomerne vážnych zistení pri zaoberaní sa problematikou komárov sú nepresné informácie, ktoré sa objavujú zo strany samospráv a sú zverejnené napr. na oficiálnych stránkach obcí, na sociálnych sie#ach alebo príslušných webových stránkach, ktoré majú informova# obyvate#ov o vykonaní postrekov proti komárom. Mnoho obcí a miest nezverej#uje názvy biocídnych prípravkov, ktoré po#as postrekov používajú, #o môže vies# k podceneniu osobnej ochrany zo strany obyvate#ov.

Aplikácia biocídov proti komárom v intraviláne

Postreky proti komárom sa v komunálnej oblasti realizujú osobnými vysokotlakovými postrekova#mi po#as chôdze pracovníka, z korby auta alebo špeciálnou technológiou - UVL termofog, ktorá vytvára aerosólový oblak za špeciálne upraveným autom. Oblak biocídneho aerosólu môže vystúpi# do výšky sedem poschodovej budovy a šíri# sa do vzdialenosti približne 1 km od miest postreku, údaje sa môžu líši# v závislosti od meteorologických podmienok. Auto s týmto zariadením prechádza ulicami miest a obcí, #o znamená, že oblak biocídu zasiahne takmer všetko v ošetrovanej obci alebo meste. Aj napriek tomu, že prípravky sú vysoko nebezpe#né pre zdravie #udí a životné prostredie a nesmie dôjs# k aplikácii v blízkosti vodných zdrojov alebo zasiahnutiu #udí, v praxi k tomu dochádza. V prípade aplikácie biocídnych prípravkov proti komárom v intraviláne miest a obcí objednávate#, respektíve zria#ovate# (odborne spôsobilá osoba), postrekov je povinný zabezpe#i# ochranu obyvate#ov po#as postreku, v prípade, že môže dôjs# k vystaveniu obyvate#ov biocídom, mali by ma# zabezpe#ené osobné ochranné pomôcky, #o sa v praxi nerobí. V prípade aplikácie biocídnych látok vysokotlakovým postrekova#om alebo metódou zadymenia nie je možné korigova# smer #astíc prípravku, #o môže vies# k priamemu vystaveniu obyvate#ov biocídom, ohrozeniu ich zdravia a zárove# aj k porušeniu platnej legislatívy. Medzi #alšie nepredpokladané situácie, ktoré pri takejto aplikácii môžu nasta#, patrí aj potreba rýchlej zdravotnej pomoci v oblasti, v ktorej práve prebieha alebo bol aplikovaný postrek proti komárom. Neexistuje obcami, mestom alebo štátom stanovený plán, ako majú postupova# záchranné služby alebo ob#ania po#as takejto situácie. Ani záchranné služby, ani verejnos#, nie sú informované o prebiehajúcich postrekoch (zákonom daná ohlasovacia povinnos# je nedostato#ná a zvä#ša neposta#uje ani k informovaniu obyvate#ov v rámci daného mesta alebo obce, #udia prechádzajúci mestom alebo obcou informácie o priebehu postreku nezachytia), nemá príslušné osobné ochranné pomôcky, #o môže spôsobi# ich ohrozenie.

„Oblak“ biocídu pri metóde zadymenia sa môže vznáša# v okolí domu aj nieko#ko hodín. Biocídne výrobky proti komárom sa vä#šinou rozkladajú slne#ným žiarením alebo pretrvávajú na povrchoch predmetov nieko#ko dní. #alšie vystavenie sa biocídom po#as postreku proti komárom môže nasta#, ke# obyvatelia budú musie# opusti# svoje obydlie napríklad z dôvodu požiaru. Je nevyhnutné neustále bra# na vedomie, že prípravky, ktoré sa pri chemickej kontrole komáríh populácií používajú, môžu pri nedodržaní bezpe#nostných nariadení výrobcov vážne poškodi# #udské zdravie. Finan#nú náro#nos# zabezpe#enia osobných ochranných pomôcok pre obyvate#ov je zo strany samosprávy náro#né.

Akejkovek metóde na zníženie po#tu komárov by mal predchádza# odborný monitoring, ktorý posúdi stav komárov pred aplikáciou ur#itej metódy a po nej.

Nekontrolované a iracionálne používanie biocídov v krajinách, ako napríklad Slovensko, v ktorých sa malária nevyskytuje a je možné použi# iné metódy redukcie komáríh populácií, môže smerova# k vzniku rezistentných komárov.

Pod#a WHO je rezistencia vo#i pyretroidom najrozširenejšia. Medzi pyretroidy patria ú#inné látky cypermetrín a deltametrín, ktoré sa v SR na redukcii komárov používajú naj#astejšie.

K riešeniu problematiky premnožených stavov komárov a zabezpe#enia komfortu obyvate#ov môže pomôc# presné definovanie postupov, ktoré dotknuté obce majú vykona# s úmyslom zníži# výskyt komárov, a to v postupe: preventívne metódy, biologické metódy, biologicko- chemické metódy, chemické metódy (len ak nezaberú iné metódy a je ohrozené verejne zdravie). V#asným a systematickým postupom môžu dotknuté obce

predís# premnoženým stavom komárov. Podcenenie situácie, neuskuto#nenie monitoringu liahnisk a vynechanie preventívnych, biologických a biologicko-chemických metód nie je dôvod k chemickej metóde kontroly komárí#ch populácií, ktorá môže ohrozi# životné prostredie a zdravie #udí. Chemická metóda kontroly komárov má slúži# v prípade neú#innosti iných metód a výskytu ochorení prenášanými komármi.

ODPORÚ#ANIA PRE SYSTEMATICKÉ RIEŠENIE PROBLEMATIKY KOMÁROV

Na základe teoretických poznatkov uvedených v publikácii Komáre a biocídy (Mgr. Ivan I#ko, doc. Ing. Viera Peterková, PhD., RNDr. Lucia Strelková, PhD., Mgr. Martin Obuch, Mgr. Dominika Pálešová; 2020) , s dôrazom na skúsenosti pri aplikácii európskej, ale aj štátnej legislatívy a jej dodržiavanie, autori navrhujú nasledovné postupy. Dôraz pri odporú#aniach kladú na zmiernenie negatívneho dopadu využívania chemických metód na boj proti komárom a nastavenie procesov bezpečnej kontroly výskytu komárov:

- nepoužíva# chemické postreky proti komárom s ú#innými látkami zo skupiny pyreteroidov kvôli hroziacej rezistencii komárov, vplyvu na životné prostredie a zdravie #udí,
- vytvori# štandardy bezpečnej aplikácie pesticídov v intraviláne miest a obcí a zabezpe#i# lepšiu ohlasovaciu povinnos#,
- vytvori# osobitné opatrenia prijaté s cie#om zníži# riziko otráv spôsobených biocídnymi výrobkami,
- zamera# sa na ur#ovanie druhov komárov v SR a testovanie zoonóz, ktoré prenášajú,
- zvyšova# povedomie o problematike biocídov, komárov a spôsoboch ich redukcie zo strany samospráv, ob#anov a štátu,
- zapoji# odbornú a zainteresovanú komunitu do riešenia problematiky,
- propagova# nechemické a biologicko-chemické metódy redukcie komárí#ch populácií,
- iniciova# zmenu autorizácie pre prípravky s ú#innou látkou Bti, aby ich bolo možné v granulovanej forme aplikova# obyvate#mi, nie len odborne spôsobilými osobami,
- zabezpe#i# štátom riadenú leteckú aplikáciu Bti prípravkov v dotknutých a #ažko dostupných lokalitách,
- zapoji# do pravidelného monitoringu liahnisk skupiny miestnych dobrovo#níkov a organizácie, napr. dobrovo#né hasi#ské zbory, neziskové organizácie a pod. Využíva# a propagova# pri monitoringu aplikáciu vyvinutú Bratislavským samosprávnym krajom (BSK), ktorá je ur#ená k efektívnemu monitoringu liahnisk komárov,
- vykonáva# monitoring liahnisk a dospelých jedincov v pravidelných intervaloch po#as celého roka. Kompetencie pri vykonávaní monitoringu rozdeli# medzi vyšší územný celok, samosprávy a ob#anov. Výskyt komárov a aplikáciu Bti v intraviláne a extraviláne miest a obcí by mala zabezpe#i# samospráva prostredníctvom dobrovo#níkov a odborne spôsobilých osôb. Výskyt komárov a aplikáciu Bti v extraviláne obcí, predovšetkým na #ažko prístupných miestach (napr. zaplavené lúky, nepokosené oblasti a pod.), by mal zabezpe#i# štát pomocou leteckej aplikácie Bti napríklad z helikoptér. Výskyt komárov a aplikáciu Bti na súkromných pozemkoch by mali zabezpe#i# ob#ania a odborne spôsobilé osoby,
- zintenzívni# koordináciu s cezhrani#nými partnermi, ke#že komáre hranice nepoznajú.

Okresný Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie Vám týmto zároveň oznamuje, že v prípade aplikácie chemických látok na súvislej ploche väčšej ako 2 ha, na území, na ktorom platí druhý stupe# ochrany, podľa zákona #. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, na území, na ktorom platí tretí stupe# ochrany sa takýto súhlas vyžaduje bez oh#adu na plošnú výmeru riešeného územia.

V súvislosti s prípadnou realizáciou opatrení vedúcich k zamedzeniu premnoženia komárov, poukazujeme na ustanovenia § 4 ods. 1 a 2 zákona OPaK, tj.:

1) Každý je pri vykonávaní #inností, ktoré môžu ohrozi#, poškodi# alebo zni#i# rastliny alebo živo#íchy, alebo ich biotopy, povinný postupova# tak, aby nedochádzalo k ich zbyto#nému úhynu alebo k poškodzovaniu a ni#eniu.

2) Ak #innos# uvedená v odseku 1 vedie k ohrozeniu existencie druhov rastlín a živo#íčov alebo k ich degenerácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto #innos# po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.

Vzh#adom na uvedené, Vám odporú#ame, aby ste v prípade realizácie postreku smerujúceho k zamedzeniu výskytu komárov, konzultovali danú #innos# so Štátnou ochranou prírody, Správou CHKO Latorica Trebišov, J.Záborského 1, 075 01 Trebišov; (CHKOLATORICA@SOPSR.SK).

Na vedomie

Obec Ba#ka, Hlavná 130, 076 84 Ba#ka
Obec Ba#kov, Hlavná 201, 076 61 Ba#kov
Obec Bara, Bara 7, 076 32 Bara
Obec Biel, Hlavná 48/98, 076 41 Biel
Obec Bo#, Hlavná ulica 216/42, 076 53 Bo#
Obec Borša, Ružová 2, 076 32 Borša
Obec Bo#any, Kvetná 243/1, 076 43 Bo#any
Obec Brehov, Hlavná 1/57, 076 05 Brehov
Obec Brezina, Brezová 151/32, 076 12 Brezina
Obec Byšta, Okružná ulica 9, 076 13 Byšta
Obec Cejkov, Hlavná 334, 076 05 Cejkov
Obec #e#ovce, Hlavná 72/49, 076 17 #e#ovce
Obec #erhov, Dlhá 100, 076 81 #erhov
Obec #ierna, Hlavná 24/17, 076 43 #ierna
Mesto #ierna nad Tisou, Námestie pionierov 151/1, 076 43 #ierna nad Tisou
Obec Dargov, Dub#ekova 227/4, 076 61 Dargov
Obec Dobrá, Hlavná 9/151, 076 41 Dobrá
Obec Dvorianky, Lipová s.#. 79, o.#. 1, 076 62 Dvorianky
Obec Egreš, Egreš 78, 075 01 Egreš
Obec Hra#, Ulica SNP 165/39, 076 03 Hra#
Obec Hr#e#, Hlavná 200/30, 076 15 Hr#e#
Obec Hriadky, Hriadky 43, 076 22 Hriadky
Obec Kašov, Hlavná 1, 076 02 Kašov
Obec Kazimír, Hlavná 93, 076 13 Kazimír
Obec Klin nad Bodrogom, Klin nad Bodrogom 34, 076 31 Klin nad Bodrogom
Obec Kožuchov, Hlavná 62/35, 076 01 Kožuchov
Mesto Krá#ovský Chlmec, L. Kossutha 99, 077 13 Krá#ovský Chlmec 1
Obec Kravany, okres Trebišov, Poto#ná 1/6, 076 61 Kravany
Obec Kuzmice, Hlavná 286/126, 076 12 Kuzmice
Obec Kysta, Kvetná 73/2, 076 02 Kysta
Obec Ladmovce, Hlavná ulica 46/59, 076 34 Ladmovce
Obec Leles, Hlavná 62, 076 84 Leles
Obec Luhy#a, Hlavná 40, 076 14 Luhy#a
Obec Malá T##a, Tokajská ulica 2, 076 82 Malá T##a
Obec Malé Ozorovce, Hlavná 108, 078 01 Malé Ozorovce
Obec Malé Trakany, Andora Petrika 208, 076 42 Malé Trakany
OBEC Malý Horeš, Družstevná 233/33, 076 52 Ve#ký Horeš
Obec Malý Kamenec, Malý Kamenec 147, 076 36 Malý Kamenec
Obec Micha#any, Hlavná 108, 076 14 Micha#any
Obec Nižný Žipov, Hlavná 177/5, 076 17 Nižný Žipov
Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad
Obec Nový Ruskov, Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Nový Ruskov
Obec Parchovany, Hlavná ulica 470/22, 076 62 Parchovany
Obec Plechotice, Hlavná 39/70, 075 01 Plechotice
Obec Po#any, Po#any, 076 84 Po#any
Obec Pribeník, S. Petöfiho 276, 076 51 Pribeník
Obec Rad, Hlavná 95/10, 076 37 Rad
Mesto Se#ovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Se#ovce
Obec Slivník, Hlavná 9/25, 076 12 Kuzmice
Obec Slovenské Nové Mesto, Hlavná ulica 79/128, 076 33 Slovenské Nové Mesto

Obec Soňa, 68 68, 076 53 Soňa
Obec Somotor, Obchodná 39/7, 076 35 Somotor
Obec Staná, Hlavná 139, 076 16 Staná
Obec Stankovce, Hlavná 1, 076 61 Stankovce
Obec Strážne, Ružová 157/21, 076 52 Strážne
Obec Streda nad Bodrogom, Hlavná 174/391, 076 31 Streda nad Bodrogom
Obec Svätá Mária, Svätá Mária 29, 076 35 Svätá Mária
Obec Svätuše, Svätuše, 076 83 Svätuše
Obec Svinice, Hlavná 75, 076 37 Svinice
Mesto Trebišov, M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 1
Obec Trnávka, okres Trebišov, Seňovská 82/4, 078 01 Trnávka
Obec Veľatý, Staničná 8/12, 076 15 Veľatý
Obec Veľká Tňa, Hlavná 122/3, 076 82 Veľká Tňa
Obec Veľké Ozorovce, Hlavná 264, 078 01 Seňovce
Obec Veľký Horeš, Družstevná 333/2, 076 52 Veľký Horeš
Obec Veľký Kamenec, Veľký Kamenec 255, 076 36 Veľký Kamenec
Obec Viničky, Tokajská 191/5, 076 31 Viničky
Obec Višňov, Hlavná 71/22, 076 61 Višňov
Obec Vojšice, Ulica P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojšice
Obec Vojka, Hlavná 84/26, 076 83 Vojka
Obec Zátin, Hlavná 241/45, 076 53 Zátin
Obec Zbeňov, Hlavná 68/30, 078 01 Zbeňov
Obec Zemplín, Zemplín, 076 34 Zemplín
Obec Zemplínska Nová Ves, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves
Obec Zemplínska Teplica, Okružná 340/2, 076 64 Zemplínska Teplica
Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392/11, 076 01 Zemplínske Hradište
Obec Zemplínsky Branš, Zemplínsky Branš, 076 02 Zemplínsky Branš

Ing. Stanislav Bogdányi
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TV-OSZP-2021/005563-005

Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie
Obec Veľké Trakany, Rákocziho 419, 076 42 Veľké Trakany
Obec Sirmík, Hlavná 152, 076 03 Sirmík